

## Inventarizace porostů

Poř.č.	Název druhu	Český název	Průměrná výška /m/	Plocha /m2/	Počet jedinců /ks/	Index překryvnosti	Zdravotní stav	Sadovnická hodnota	Poznámka
A	Cotoneaster dammeri Philadelphus coronarius Ribes sanguineum Chaenomeles speciosa Spiraea vanhouttei Acer platanooides Rosa canina	skalník pustoryl meruzalka kdoulovec tavolník javor růže	3	32	-	100%	3	3	nálet javoru, keře značně přestálé
B	Spiraea vanhouttei	tavolník	1,7	5,5	1	60%	3	3	
C	Forsythia sp. Ribes alpinum Syringa vulgaris Philadelphus coronarius	zlatice meruzalka šeřík pustoryl	1,3	5	2 1 1 1	60%	2	3	přestálé keře, neudržované, značně proschlé
D	Spiraea vanhouttei	tavolník	1,7	22,5	-	60%	3	3	
E	Spiraea vanhouttei Sambucus nigra Acer platanooides Ribes sanguineum Philadelphus coronarius Prunus cerasifera	tavolník bez javor meruzalka pustoryl myrobalán	4	16,5	-	80%	2	2	přestálé keře, neudržované, přerostlé
H	Ribes sanguineum	meruzalka	2,5	6,5	3	50%	2	2	neudržované, přestálé keře
J	Philadelphus coronarius Sambucus nigra	pustoryl bez	3	21,5	-	100%	2	2	neudržované, přestálé keře
K	Philadelphus coronarius Sambucus nigra	pustoryl bez	4	6,5	-	100%	2	2	neudržované, přestálé keře
L	Ribes sanguineum Spiraea vanhouttei	meruzalka tavolník	2	3	2	70%	2	2	neudržované, přestálé keře
M	Ribes sanguineum	meruzalka	1,5	1	1	50%	2	2	neudržované, přestálé keře